

CABINET DE CHIRURGIE DENTAIRE

Activité liée exclusivement à l'implantologie et à la chirurgie buccale

Dr Olivier CHOFFEL

Chirurgien Dentiste

CONSEILS POST-OPERATOIRES

Vous venez de bénéficier d'une intervention chirurgicale de la bouche ou des maxillaires.

1- Suivez les **prescriptions de l'ordonnance** qui vous a été remise. Cependant, en cas d'éruption cutanée avec démangeaisons ou en cas d'apparition de brûlures d'estomac, mettez-vous en rapport avec nous afin de la modifier.

2- Les **saignements** : il est fréquent qu'un petit saignement persiste pendant quelques heures à une nuit suivant l'intervention.

Le traitement consiste à appliquer une compresse sur la zone de l'extraction et mordre sur celle-ci tant que le saignement ne s'est pas arrêté. Afin de ne pas évacuer le caillot sanguin qui s'est formé dans l'alvéole, **les bains de bouche qui vous seront prescrits ne doivent pas être faits pendant les premières 48 heures suivant l'acte chirurgical.**

3- La **douleur** au niveau des zones opérées est plus fréquente en bas qu'en haut. Elle cède souvent avec des antalgiques et disparaît en quelques jours. Un traitement adapté sera prescrit à votre sortie par votre chirurgien. Des glaçons enrobés dans un linge (pas directement sur la peau) diminuent le gonflement et la douleur.

4- Un **oedème** ou un **hématome** peuvent apparaître en regard de la zone opérée et augmenter durant les 72 premières heures.

Ceci est normal ; ils peuvent prendre des proportions importantes selon les individus et le type d'opération. Le traitement et les vessies de glace permettront de réduire la douleur et l'importance de cette déformation.

5- Une **limitation de votre ouverture buccale** peut exister pendant plusieurs jours. Celle-ci est due à l'hématome qui provoque une contracture musculaire ; ne forcez pas, elle cédera petit à petit.

6- Des **points** ont pu être posés au niveau de votre gencive. Ils se **résorberont** spontanément en 3 semaines - un mois, mais s'ils persistent ou s'ils vous gênent, il vous sera possible de les faire retirer après 15 jours.

7- Le **brossage dentaire pourra être repris dès le lendemain de l'intervention**, en évitant la zone opérée pendant 3 ou 4 jours. Après ce délai, vous pouvez nettoyer cette zone avec une brosse à dents souple, dite chirurgicale que vous trouverez en pharmacie.

9 résidence Beau Rivage (route de Bischwiller), 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Tel : 03.88.20.09.45. Email : dr.olivier.choffel@wanadoo.fr. Site : www.docteurchoffel.fr

CABINET DE CHIRURGIE DENTAIRE

Activité liée exclusivement à l'implantologie et à la chirurgie buccale

Dr Olivier CHOFFEL

Chirurgien Dentiste

En résumé, vous devez respecter un certain nombre de précautions pendant 48 heures :

- Ne pas faire de bains de bouche et ne pas cracher car cela favorise le saignement
- Privilégier une alimentation mixée
- Ne rien boire ou manger de chaud
- Dormir la tête surélevée
- Placer une vessie de glace sur la peau au niveau des zones opérées.

En cas de problème, vous pouvez contacter :

Le **cabinet dentaire** où vous avez été opéré.

Le **15** dans les cas les plus graves.

9 résidence Beau Rivage (route de Bischwiller), 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Tel : 03.88.20.09.45. Email : dr.olivier.choffel@wanadoo.fr. Site : www.docteurchoffel.fr